

# Leishmaniose Visceral

## Dos animais aos homens

**O que é?** A leishmaniose visceral é uma zoonose (doença que afeta os animais), mas que pode ser transmitida aos seres humanos. É também chamada de calazar e é causada por um parasita protozoário chamado *Leishmania infantum*.

### Transmissão

1


A transmissão se dá pela picada de flebótomos, conhecidos como mosquito palha, cangalhinha, asa-dura, entre outros. Eles se alimentam do sangue de animais contaminados, como **cachorros** e raposas, adquirindo o parasita.



2

No intestino do flebótomo, a *Leishmania* se desenvolve e o “mosquito” se torna transmissor.

A doença afeta principalmente crianças pequenas mal nutridas.



3

Ao picar seres humanos e outros animais, o flebótomo infecta esses indivíduos.

### Sintomas

Os parasitas se disseminam pelas células de defesa do organismo e concentram-se no baço, no fígado e na medula óssea. As manifestações são febre, perda de peso e de apetite, crescimento do baço, fígado e gânglios linfáticos, anemia, modificações dos glóbulos brancos, plaquetas, hemorragias e infecções bacterianas. A evolução da doença não tratada é quase sempre fatal.



### Diagnóstico

É realizado pela coleta de exame de sangue para sorologia e de sangue da medula óssea para pesquisa do parasita.

### Tratamento

O tratamento é gratuito e deve ser feito no hospital.

- Não ocorre a transmissão de pessoa para pessoa.
- O tempo entre a picada do ‘mosquito’ até o surgimento da doença varia de 6 semanas a 6 meses.
- Existem outros tipos de leishmaniose que não devem ser confundidos com a leishmaniose visceral. Um tipo de leishmaniose não se transforma no outro.