




DEFINIÇÃO


Todo indivíduo que, independentemente do estado vacinal, apresente tosse há dez dias ou mais associada a: tosse paroxística (súbita, incontrolável) guincho inspiratório, vômitos pós – tosse, cianose, apnéia, engasgo, ou que apresente tosse em qualquer período, com história de contato próximo de caso confirmado de coqueluche pelo critério laboratorial

UBS / UPA



COQUELUCHE

DVE



Orientações para coleta de Swab:

- Caixa de isopor, gelox, máscara, luva;
- Coletar amostra de secreção nasofaríngea do doente até no máximo o 3º dia de uso de antibiótico.
- Caso tenha contato que apresente tosse, realizar coleta de nasofaringe e ofertar o antibiótico Azitromicina (01 comp./dia por 05 dias)
- Caso não tenha contato sintomático, realizar coleta do cuidador e ofertar o antibiótico.

Tratamento com Azitromicina

- Menor de 6 meses: 10mg/kg em uma dose ao dia durante 5 dias.
- 6 meses ou mais: 10mg/kg (máximo de 500 mg) em uma dose no 1º dia e 5 mg/kg (máximo de 250 mg) em uma dose ao dia do 2º ao 5º dia.
- Adultos: 500mg - 1 comprimido ao dia, por 5 dias