


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAÇÃO		POP Nº 001 VERSÃO Nº 01
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ____/____/____	 MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: Vacina BCG		
Executante: Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem		
Objetivo: Apresentar informações sobre a vacina BCG.		
VACINA BCG (Bacilo de Calmette Guérin)		
Tipo de vacina	Suspensão de bacilos atenuados	
Número de doses	Uma dose ao nascer, o mais precoce possível	
Idade recomendada	Ao nascer, podendo ser realizada até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Em adultos, apenas para contatos de hanseníase	
Conservação	Temperatura: +2°C a +8°C Tempo de duração: observar o prazo de validade do produto. Não pode ser exposta à luz solar direta ou difusa , mesmo por curto período. Após diluição, a vacina só poderá ser utilizada dentro de um período de 6 horas.	
Via de administração	Intradérmica, na altura da inserção inferior do músculo deltóide do braço direito. Para o comunicante de hanseníase, a dose extra deverá ser administrada 1 cm abaixo da cicatriz vacinal.	
Dose	0,1 ml	
Eficácia esperada	Cerca de 80% contra as formas graves, como meningite e tuberculose miliar	
Contraindicações	Contraindicações de caráter geral. Ressalta-se a imunodeficiência adquirida (Aids); Não é recomendável a aplicação da BCG em crianças com menos de 2kg de peso, devido à escassez do tecido dérmico.	
Evolução normal da lesão	Lesão local, de evolução lenta e benigna, que se inicia por mácula, evolui para pápula, crosta e úlcera, durando em geral dois meses e deixando cicatriz plana. O enfartamento ganglionar axilar não supurado faz parte da evolução normal e desaparece espontaneamente sem tratamento.	
Eventos adversos	O evento adverso resulta em geral de técnica incorreta: aplicação profunda ou inoculação de dose excessiva. As mais comuns são abscesso, úlceras > que 1 cm, gânglios flutuantes e fistulizados.	
Uso em comunicantes de hanseníase	Vacinados com uma dose há menos de 1 ano: não vacinar Vacinados há mais de 1 ano com uma única dose: vacinar com mais uma dose Vacinados com 2 doses: não vacinar	