


<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> <b>VACINA CONTRA HEPATITE B</b>		<b>POP Nº 002</b> <b>VERSÃO Nº 01</b>
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ____/____/____	 <b>MUNICÍPIO DE ITAJAÍ</b>
<b>Atividade:</b> Vacina contra Hepatite B <b>Executante:</b> Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem		
<b>Objetivo:</b> Apresentar informações sobre a vacina contra hepatite B.		
<b>VACINA CONTRA HEPATITE B</b>		
Tipo de vacina	Recombinação de ADN - engenharia genética	
Número de doses e intervalo entre as doses	<ul style="list-style-type: none"> <li>Três doses com intervalo de 0 – 1 – 6 meses;</li> <li>Quatro doses com intervalo de 0 – 1 – 2 – 6 a 12 meses, para as situações especiais do CRIE;</li> <li>Doses dobradas para hemodialisados e imunodeprimidos</li> </ul>	
Idade recomendada	A partir do nascimento, o mais cedo possível.	
Conservação	Temperatura: +2°C a +8°C Tempo de duração: Observar o prazo de validade do produto. Utilizar até 15 dias após abertura do frasco (ou conforme laboratório produtor).	
Via de administração	Intramuscular no músculo anterior da coxa, região ventroglútea (Hochsteter), lateral da coxa ou deltoide, dependendo da idade do receptor.	
Dose	0,5ml até 19 anos 11 meses e 29 dias de idade e 1ml em indivíduos a partir de 20 anos. No entanto, observar outras recomendações, a depender do laboratório produtor.	
Eficácia esperada	Superior a 95%. (Após 3ª dose)	
Duração da imunidade	Prolongada	
Indicação	<ul style="list-style-type: none"> <li>Para todos os indivíduos;</li> <li>Caso haja atraso da segunda dose, a terceira deverá aguardar pelo menos dois meses após a segunda dose.</li> </ul>	
Contraindicações	Anafilaxia em dose anterior.	
Eventos adversos	Febre, cefaleia, reações locais leves, mal-estar e, raramente, anafilaxia.	
<p>1. Doses e volume das vacinas hepatite B Laboratório Butantan e Serum</p> <p>1.1 Instituto Butantan: Pessoas até 19 anos de idade – 0,5 mL</p> <p>Pessoas a partir de 20 anos de idade – 1,0 mL</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Validade após abertura do frasco: 15 dias, se mantida em condições assépticas e armazenado em temperatura entre +2°C a +8°C.</li> </ul> <p>1.2 Serum Institute of India: Pessoas até 19 anos de idade – 0,5 mL</p> <p>Pessoas a partir de 20 anos de idade – 1,0 mL</p>		