

| | | |
|---|--|---|
| PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAÇÃO | | POP Nº 003 VERSÃO Nº 01 |
| Data da Emissão: 14/11/2019 | Próxima revisão: ___/___/___ |  |
| Atividade: Vacina DTP e dT | | |
| Executante: Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem | | |
| Objetivo: Apresentar informações sobre a vacina DTP e dT. | | |
| VACINA DTP e dT | | |
| Tipo de vacina | <ul style="list-style-type: none"> • DTP – toxoide diftérico + toxoide tetânico + bactéria da coqueluche (tríplice bacteriana); • dT – toxoide diftérico + tetânico (dupla adulto). | |
| Número de doses e intervalos entre as doses | <ul style="list-style-type: none"> • DTP: duas doses de reforço, uma aos 15 meses e outra aos 4 anos. O intervalo entre a terceira dose (com penta) e o reforço com DTP e entre as duas doses de reforço com DTP é no mínimo de 06 meses. Manter reforços de 10 em 10 anos com a vacina (dT) dupla adulto; • dT: A partir dos 7 anos de idade, para aqueles indivíduos ainda não vacinados ou com esquema incompleto. <ul style="list-style-type: none"> • Três doses com intervalo de 60 dias (mínimo de 30 dias); • Nos casos de gravidez e ferimentos graves, o reforço deverá ser antecipado para 05 anos. O ref. no caso de gestante deve ser feito com dTpa; • As crianças que, por atraso do esquema vacinal, receberem o 1º reforço da DTP após o 5º aniversário (5 anos) estão dispensadas do 2º reforço com essa vacina, devendo receber uma dose de dT em 10 anos após a última dose com DTP. | |
| Idade recomendada | <ul style="list-style-type: none"> • DTP: reforço aos 15 meses e 4 anos. Pode ser utilizada até 6 anos, 11 meses e 29 dias. • A partir de sete anos: usar a dupla adulto (dT). | |
| Conservação | <p style="text-align: center;">Temperatura: +2 a +8°C</p> <p>Tempo de duração: Observar o prazo de validade e conservação do produto; após a abertura do frasco utilizar o conteúdo em até 15 dias.</p> | |
| Via de administração | Intramuscular profunda | |
| Dose | 0,5 ml (ou de acordo com o laboratório produtor). | |
| Eficácia esperada | <ul style="list-style-type: none"> • Difteria: 80 a 90% (após 3ª dose); • Coqueluche: em torno de 75 a 80% (após 3ª dose); • Tétano: aproximadamente 100% (após 3ª dose). | |
| Duração de imunidade | <ul style="list-style-type: none"> • Coqueluche e difteria – alguns anos; • Tétano – acima de 10 anos. | |
| Contraindicações | <ul style="list-style-type: none"> • Indivíduos com doença neurológica em atividade. • Indivíduos que tenham apresentado os seguintes sintomas ou patologias após a(s) aplicação (ões) de dose(s) anterior(es): <ol style="list-style-type: none"> a) Convulsão nas primeiras 72 horas; b) Encefalopatia nos primeiros sete dias; c) Episódio hipotônico-hiporresponsivo; d) Neuropatia periférica; e) Reação de Arthis; f) Síndrome de Guillain Barré; g) Anafilaxia (choque anafilático). | |

| | |
|------------------|---|
| Eventos adversos | <ul style="list-style-type: none">• Leves: dor, vermelhidão e enduração locais, febre, mal-estar geral e irritabilidade nas primeiras 24 ou 48 horas;• Graves: convulsão e episódio hipotônico-hiporresponsivo, anafilaxia e encefalopatias. |
|------------------|---|