


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAÇÃO		POP Nº 004 VERSÃO Nº 01
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ____/____/____	
Atividade: Vacina dTp acelular.		
Executante: Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem		
Objetivo: Apresentar informações sobre a vacina dTpa.		
VACINA dTpa		
Tipo de vacina	<ul style="list-style-type: none"> Vacina inativada composta por toxoides diftérico, tetânico e pertussis; <ul style="list-style-type: none"> Adsorvida em hidróxido e fosfato de alumínio.; Forma de apresentação: suspensão em frasco, seringa monodose com 0,5ml. 	
Indicação	<p>A vacina é indicada para gestantes. A cada gestação, a partir da 20ª semana de gestação podendo ser administrada até 45 dias após o parto. Importante vacinar o mais precocemente possível dentro da indicação do período de gestação pelo risco de intercorrências, por exemplo, do parto prematuro.</p> <p>A vacina é indicada para profissionais de saúde. Esta vacina pode ser usada no segundo reforço, a partir de 4 anos, em detrimento da DTPa (pacientes CRIE).</p>	
Número e intervalo entre as doses	<p>Para gestante: O esquema recomendado da vacina tipo adulto-dTpa é uma dose a cada gestação;</p> <p>A depender da situação vacinal encontrada, administrar uma dose da vacina dTpa para iniciar esquema vacinal, completar ou como dose de reforço. Para profissionais de saúde: administração de uma dose de dTpa e reforço a cada dez anos com dTpa (em detrimento da dT) caso continue na mesma função no trabalho.</p>	
Conservação	<p>Temperatura: +2 a +8°C</p> <p>Tempo de duração: Observar o prazo de validade e conservação do produto; após a abertura do frasco utilizar o conteúdo imediatamente.</p>	
Via de administração	Intramuscular profunda na região ventroglútea ou deltóide.	
Dose	0,5 ml (ou de acordo com o laboratório produtor).	
Eficácia esperada	<p>A efetividade da vacina na prevenção da doença em lactantes até os três meses de idade, foi estimada em 91%, quando a vacina é aplicada até 28 dias antes do parto. Posteriormente, a proteção conferida pela mãe é progressivamente menor, sendo de 38% se a vacina é aplicada na última semana de gravidez. Após a administração de dTpa, é necessário um mínimo de duas semanas para gerar uma resposta imune máxima para os antígenos da vacina.</p>	
Contraindicações	Anafilaxia e eventos neurológicos subsequentes à administração de dT e dTpa e a seus componentes.	
Eventos adversos	<p>Locais: dor, hiperemia e enduração.</p> <p>Sistêmicos: febre > ou = a 40º C, convulsão febril, episódio hipotônico-hiporresponsivo (raro).</p>	