


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAÇÃO		POP Nº 005 VERSÃO Nº 01
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ___/___/___	
Atividade: Vacina pentavalente		
Executante: Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem		
Objetivo: Apresentar informações sobre a vacina pentavalente		
VACINA PENTAVALENTE		
Tipo de vacina	DTP + Hib +HB – toxoide diftérico + toxoide tetânico + bactéria da coqueluche + proteína da cápsula do <i>Haemophilus influenzae b</i> (PRP) + vírus inativado (engenharia genética) da hepatite B.	
Número e intervalo entre as doses	Três doses, aos 2, 4 e 6 meses, com o intervalo de 60 dias entre as doses (intervalo mínimo de 30 dias).	
Idade recomendada	2 meses, 4 meses e 6 meses, podendo ser utilizada, quando necessário, até 6 anos, 11 meses e 29 dias (idade em que as crianças ainda podem receber a DTP de célula inteira); A partir de sete anos: usar a dupla adulto (dT).	
Conservação	Temperatura: +2 a +8°C Tempo de duração: Observar o prazo de validade e conservação do produto; após a abertura do frasco utilizar o conteúdo imediatamente (frasco unidose) ou conforme orientação do laboratório produtor.	
Via de administração	Intramuscular profunda.	
Dose	0,5 ml (ou de acordo com o laboratório produtor).	
Eficácia esperada	Difteria: 80 a 90% (após 3ª dose); Coqueluche: em torno de 75 a 80% (após 3ª dose); Tétano: aprox. 100% (após 3ª dose); <i>Haemophilus</i> : em torno de 95% (após 3ª dose); Hepatite B: em torno de 95% (após 3ª dose).	
Duração de imunidade	Coqueluche e difteria: alguns anos; Tétano: acima de 10 anos; <i>Haemophilus</i> : vários anos; Hepatite B: vários anos.	
Contraindicações	Crianças com doença neurológica em atividade; Crianças que tenham apresentado após a(s) aplicação(ões) de dose(s) anterior(es): a) convulsão nas primeiras 72 horas; b) encefalopatia nos primeiros sete dias; c) episódio hipotônico-hiporresponsivo; d) anafilaxia. e) Troca de esquema para crianças que estejam internada em terapia intensiva. Deve ser solicitado a DTPa , devido risco de febre. – Nas situações acima, em que houve alguns dos sintomas descritos	

	em a, b, c ou d, preencher a ficha de notificação de EAPV e encaminhar ao DVE, a fim de que sejam solicitadas as vacinas DTP acelular para as próximas doses.
Eventos adversos	<p>Leves: dor, vermelhidão e enduração locais, febre, mal-estar geral e irritabilidade nas primeiras 24 ou 48 horas;</p> <p>Graves: convulsão e episódio hipotônico-hiporresponsivo, anafilaxia e encefalopatias.</p>