


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAÇÃO		POP Nº 006 VERSÃO Nº 01
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ____/____/____	 MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: Vacina contra <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B (IMUNOESPECIAL)		
Executante: Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem		
Objetivo: Apresentar informações sobre a vacina contra <i>Haemophilus influenzae</i> tipo B.		
VACINA CONTRA <i>HAEMOPHILUS INFLUENZAE</i> tipo B		
Tipo de vacina	Polissacídeo conjugado a uma proteína (toxóide diftérico, toxóide diftérico mutante não tóxico – CRM – 27, membrana externa da <i>Neisseria meningitidis</i> B e toxóide tetânico).	
Número de doses	No primeiro ano de vida: esquema de 3 doses, com intervalo de 60 dias, a partir de 2 meses de idade.	
Idade recomendada	De 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias <ul style="list-style-type: none"> Para os menores de 1 ano = 3 doses e 1 dose de reforço com 1 ano e 3 meses Para os maiores de 1 ano = depende da condição de saúde e liberação do CRIE. 	
Conservação	Temperatura: +2°C a +8°C Tempo de duração: observar o prazo de validade. Utilizar por até 5 dias após a abertura do frasco.	
Via de administração	Subcutânea ou intramuscular – conforme laboratório produtor.	
Dose (volume)	0,5 ml (ou conforme laboratório produtor).	
Eficácia esperada	Próxima de 100% (após 3ª dose).	
Duração da imunidade	Prolongada.	
Indicações	Na rotina: crianças de 2 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias; No CRIEs: ver manual CRIE, p.133. <ul style="list-style-type: none"> Indicada uma dose para prematuros < 31 semanas de gestação ou < 1 kg (continuar esquema com pentavalente conforme rotina quando não houver contraindicação). Indicada como imunoespecial, na substituição da pentavalente de rotina. 	
Contraindicações	As contraindicações gerais; Hipersensibilidade a qualquer componente da vacina.	
Eventos adversos	Reações locais: dor, eritema, edema, calor e enduração; Reações sistêmicas: febre, erupção cutânea, irritabilidade e sonolência.	

*A vacina Hib NÃO protege contra as infecções causadas por outros tipos de *Haemophilus influenzae*, nem contra as meningites de outras origens.