


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAÇÃO		POP Nº 008 VERSÃO Nº 01
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ____/____/____	 MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: Vacina inativada contra poliomielite (VIP ou SALK). Executante: Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem		
Objetivo: Apresentar informações sobre a vacina inativada contra poliomielite (VIP ou SALK).		
VACINA INATIVADA CONTRA POLIOMIELITE (VIP ou SALK)		
Tipo de vacina	Vírus inativado trivalente (I, II e III).	
Número de doses	Três doses, aos 2, 4 e 6 meses. Com intervalo de 60 dias (intervalo mínimo de 30 dias).	
Idade recomendada	2, 4 e 6 meses na rotina, ou imunoespecial para demais idades, conforme indicação pelo CRIE.	
Conservação	Temperatura: +2°C a +8°C Tempo de duração: Depois de aberto utilizar imediatamente ou conforme orientação do laboratório produtor.	
Via de administração	IM.	
Dose (volume)	0,5 ml	
Indicações	Na rotina para toda criança aos 2, 4 e 6 meses. Para crianças expostas ao HIV, recomenda-se as doses de reforço com 1 ano e 3 meses e aos 4 anos com VIP. Para alguns indivíduos com indicações de saúde, indicadas e liberadas pelo CRIE.	
Contraindicações	Nenhuma contraindicação prática, apenas as de caráter geral.	
Eventos adversos	Locais: eritema, enduração, hiperestesia.	