


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAÇÃO		POP Nº 009 VERSÃO Nº 01
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ____/____/____	 MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: Vacina rotavírus		
Executante: Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem		
Objetivo: Apresentar informações sobre a vacina rotavírus.		
VACINA ROTAVÍRUS		
Tipo de vacina	Vírus vivo atenuado, monovalente, cepa RIX 4414, sorotipo G1 (P8)	
Número de doses	2 doses. O paciente que não receber a primeira dose também não deve receber a segunda. Nunca se repete a dose.	
Idade recomendada	2 meses e 4 meses. Idade mínima de 1 mês e 15 dias e máxima de 3 meses e 15 dias para a primeira dose; idade mínima de 3 meses e 15 dias e máxima de 7 meses e 29 dias para a segunda dose. Intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.	
Conservação	Temperatura: +2°C a +8°C Tempo de duração: Até a validade do produto. Depois de aberto, utilizar imediatamente ou conforme orientação do laboratório produtor.	
Via de administração	Oral	
Dose (volume)	1,5 ml dependendo do laboratório produtor	
Eficácia esperada	70% para todas as formas de diarreia, 86% para as formas graves de diarreia e 80% para hospitalização por rotavírus.	
Duração de imunidade	Não há estudos sobre a persistência da imunidade.	
Contraindicações	<ul style="list-style-type: none"> • Imunodeficiência congênita ou adquirida; • Uso de corticoide em dose imunossupressora – (criança 2mg/kg/dia e adultos 20 mg/kg/dia por 14 dias); <ul style="list-style-type: none"> • Uso de imunossupressor; • Presença de doença gastrointestinal crônica; • Má formação congênita do trato digestivo; <ul style="list-style-type: none"> • História prévia de intussuscepção; • Presença de diarreia ou vômito intenso (que levem a desidratação). 	
Eventos adversos	<ul style="list-style-type: none"> • Muito comum: irritabilidade; • Comum: perda do apetite, diarreia, vômito, flatulência, dor abdominal, febre, fadiga; • Incomum: constipação, sonolência, distúrbio do sono; • Raros: câibras, dermatite, exantema, rouquidão, rinorreia. 	
Administração com outras vacinas	<ul style="list-style-type: none"> • A vacina Rotavírus Humano Vivo Atenuado Oral pode ser administrada concomitantemente ou com qualquer intervalo de tempo entre as demais vacinas monovalentes ou combinadas. Apenas nos casos em que não é possível a administração concomitante da vacina rota com a vacina pólio oral deve-se manter um intervalo de 15 dias entre as mesmas. 	