


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAÇÃO		POP Nº 010 VERSÃO Nº 01
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ____/____/____	 MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: Vacina pneumocócica 10 valente conjugada.		
Executante: Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem		
Objetivo: Apresentar informações sobre a vacina pneumocócica 10 valente conjugada.		
VACINA PNEUMO 10		
Idade recomendada	1ª dose aos 2 meses; 2ª dose aos 4 meses; e o reforço aos 12 meses.	
Conservação	Temperatura: +2°C a +8°C Tempo de duração: Depende do laboratório produtor; Observar o prazo de validade do produto; Utilizar imediatamente após a reconstituição ou de acordo com a bula do fabricante.	
Via de administração	Intramuscular.	
Dose	0,5 ml (ou conforme laboratório produtor).	
Duração de imunidade	Prolongada sempre que a vacina for conjugada.	
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • Para crianças de 2 meses até 4 anos 11 meses e 29 dias; • Criança acima de 1 ano caso tenha alguma dose em atraso ou não tenha feito nenhuma dose, recebe apenas 1 dose de reforço. • O intervalo mínimo entre as doses e o reforço é de 2 meses. 	
Contraindicações	Reação alérgica a qualquer um dos componentes da vacina e nas situações de adiamento da vacinação.	
Eventos adversos	<ul style="list-style-type: none"> • Locais: dor, rubor, edema, enduração no local da aplicação; • Sistêmicos: febre > 38 °C, choro, irritabilidade, sonolência, perda do apetite; • Raros: convulsão febril, <i>rash</i>, reações alérgicas do tipo dermatite atópica, eczema. 	