


<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> <b>ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAÇÃO</b>		<b>POP Nº 011</b> <b>VERSÃO Nº 01</b>
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ____/____/____	
<b>Atividade:</b> Vacina meningocócica C		
<b>Executante:</b> Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem		
<b>Objetivo:</b> Apresentar informações sobre a vacina meningocócica C.		
<b>VACINA MENINGO C</b>		
Tipo de vacina em uso no Brasil	<i>Oligossacarídeo Meningocócico C</i> conjugado com a proteína CRM-197 de <i>Corynebactérium diphteriae</i>	
Número de doses	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para o menor de 1 ano, duas doses com reforço aos 12 meses;</li> <li>• Criança entre 1 ano a menor de 5 anos de idade não vacinada deverá receber apenas uma dose desta vacina;</li> <li>• O intervalo mínimo entre as doses é 60 dias e entre a segunda dose e o reforço é de 60 dias.</li> </ul>	
Idade recomendada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• A partir dos 2 meses. No Brasil, na vacina de rotina, no terceiro e quinto mês, podendo ser aplicada até 4 anos 11 meses e 29 dias. Crianças que recebem uma dose a partir de 1 ano não necessitam de mais doses ou reforços.</li> </ul>	
Conservação	Temperatura: +2°C a +8°C Tempo de duração: depende do laboratório produtor; Observar o prazo de validade do produto; Utilizar imediatamente após a reconstituição ou de acordo com a bula do fabricante.	
Via de administração	Intramuscular	
Volume da dose	0,5 ml (ou conforme laboratório produtor)	
Duração da imunidade	Prolongada sempre que a vacina for conjugada.	
Indicações	Para crianças de 2 meses até 4 anos 11 meses e 29 dias. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicada para alguns indivíduos em qualquer idade que apresentem indicações conforme CRIE, no esquema de 2 ou 3 doses, a depender da indicação. Deve ser solicitado imunoespacial ao DVE.</li> </ul>	
Contraindicações	Reação alérgica a qualquer um dos componentes da vacina e nas situações de adiamento da vacinação.	
Eventos adversos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Locais: rubor, edema, endurecimento e hipersensibilidade/dor;</li> <li>• Sistêmicos: Crianças pequenas: febre, choro, irritabilidade, sonolência ou comprometimento do sono, anorexia, diarreia e vômitos; Adultos: vertigem, febre, cefaleia, náuseas e vômitos, desmaios, mialgia e artralgia;</li> </ul>	