


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAÇÃO		POP Nº 014 VERSÃO Nº 01
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ____/____/____	 MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: Vacina contra hepatite A		
Executante: Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem		
Objetivo: Apresentar informações sobre a vacina contra hepatite A		
VACINA CONTRA HEPATITE A (inativada e adsorvida)		
Tipo de vacina	Vacina de vírus inativado, adsorvida, purificada, injetável, apresentação em frasco unidose de 25U/0,5ml para uso em crianças.	
Número de doses	Dose única para crianças de 15 meses. Duas doses para critérios especiais do CRIE, com intervalo de 6 meses entre as doses.	
Idade recomendada	A partir dos 15 meses, podendo ser aplicada na rede pública até a idade de 4 anos, 11 meses e 29 dias.	
Conservação	Temperatura: +2°C a +8°C Tempo de duração: Observar o prazo de validade do produto. Utilizar imediatamente após a abertura do frasco.	
Via de administração	Intramuscular profunda no músculo vasto lateral esquerdo.	
Dose (volume)	0,5 ml.	
Eficácia esperada	Superior a 99%.	
Duração da imunidade	Prolongada	
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • Na rotina está indicada para crianças a partir de 15 meses. • A vacina pode ser indicada para outras faixas etárias segundo critérios do CRIE. • É indicada e utilizada como vacina especial conforme os critérios do CRIE para crianças e adolescentes < 17 anos 11 meses 29 dias. 	
Contraindicações	<ul style="list-style-type: none"> • As contraindicações de caráter gerais; • Hipersensibilidade conhecida a qualquer componente da vacina. 	
Eventos adversos	<ul style="list-style-type: none"> • Locais: dor, vermelhidão e edema no local da aplicação. • Sistêmicos: fraqueza, cansaço, febre, diarreia, dor abdominal, náuseas, vômito, dor de garganta, resfriado, cefaléia, dor muscular. 	