


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAÇÃO		POP Nº 015 VERSÃO Nº 01
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ____/____/____	 MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: Vacina contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela – tetra viral Executante: Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem		
Objetivo: Apresentar informações sobre a vacina contra sarampo, caxumba, rubéola e varicela – tetra viral.		
VACINA CONTRA SARAMPO, CAXUMBA, RUBÉOLA E VARICELA – TETRA VIRAL		
Tipo de vacina	Vírus atenuado.	
Número de doses	Dose única para crianças de 15 meses previamente vacinadas com uma dose de VTV.	
Idade recomendada	A partir dos 15 meses podendo ser aplicada na rede pública até 4 anos 11 meses e 29 dias.	
Conservação	Temperatura: +2°C a +8°C Tempo de duração: Observar o prazo de validade do produto. Utilizar imediatamente após diluição.	
Via de administração	Subcutânea na região posterior do deltoide esquerdo.	
Dose (volume)	0,5 ml.	
Eficácia esperada	Acima de 95%.	
Duração da imunidade	Prolongada.	
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> • A partir de 15 meses. 	
Contraindicações	<p>As contraindicações de caráter geral:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hipersensibilidade conhecida à neomicina ou qualquer outro componente da vacina; • Hipersensibilidade após administração das vacinas: sarampo, caxumba, rubéola e/ou varicela; <ul style="list-style-type: none"> • Imunodeficiência primária ou secundárias. 	
Eventos adversos	<ul style="list-style-type: none"> • Locais: dor, vermelhidão, vesículas no local da aplicação; • Sistêmicos: febre, exantema, convulsão febril, anafilaxia, meningite, herpes-zoster grave, encefalite, ataxia, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, pneumonia, trombocitopenia e síndrome de Guillain-Barré. 	