


PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAÇÃO		POP Nº 017 VERSÃO Nº 01
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ____/____/____	 MUNICÍPIO DE ITAJAÍ
Atividade: Vacina recombinante contra o HPV		
Executante: Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem		
Objetivo: Apresentar informações sobre a vacina recombinante contra o HPV Quadrivalente		
VACINA RECOMBINANTE CONTRA O HPV Quadrivalente 6,11,16,18		
Tipo de vacina	Vírus inativado de cultivo celular.	
Número de doses e intervalo entre as doses	<ul style="list-style-type: none"> Para meninas de 9 a 14 anos, e meninos de 11 a 14 anos, esquema de 2 doses, nos momentos 0 – 180 dias, (a segunda 180 dias depois da primeira); 	
Conservação	Temperatura: +2°C a +8°C Tempo de duração: observar o prazo de validade do produto. Usar imediatamente após a reconstituição.	
Via de administração	Intramuscular, preferencialmente na região ventroglútea (Hochstetter) ou deltoide em segunda opção.	
Dose (volume)	0,5 ml (ou conforme laboratório produtor).	
Eficácia esperada	86% para as lesões de alto grau.	
Indicações	<ul style="list-style-type: none"> Para meninas de 9 a 14 anos, e meninos de 11 a 14 anos na rotina e imunoespecial de 9 a 26 anos conforme indicação do CRIE. Indicações pelo CRIE: indivíduos imunodeprimidos (submetidos a transplantes de órgãos sólidos, transplante de medula óssea ou pacientes oncológicos), esquema vacinal de três doses (0, 2 e 6 meses), para ambos os sexos, na faixa etária de 9 a 26 anos. 	
Contraindicações	<ul style="list-style-type: none"> Hipersensibilidade a qualquer um dos componentes da fórmula; Gestantes. No caso de vacinar inadvertidamente uma gestante, interromper a vacinação e voltar a vacinar com a dose faltante após o parto. 	
Eventos adversos	<ul style="list-style-type: none"> Locais: dor, eritema e edema no local da aplicação; Sistêmicos: cefaleia, fadiga, mal estar, náusea ou vômito, febre de 38 graus ou mais, síncope (desmaio) e reações de hipersensibilidade. 	