

<b>PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP</b> <b>ATENDIMENTO NA SALA DE VACINAÇÃO</b>		<b>POP Nº 019</b> <b>VERSÃO Nº 01</b>
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ___/___/___	 <b>MUNICÍPIO DE</b> <b>ITAJAÍ</b>
<b>Atividade:</b> Vacina Varicela		
<b>Executante:</b> Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem		
<b>Objetivo:</b> Apresentar informações sobre a vacina Varicela.		
<b>VACINA VARICELA (VZ)</b>		
Tipo de vacina	Vírus vivo atenuado	
Número de doses	1ª dose: aos 15 meses de idade (vacina tetraviral) 2ª dose: aos 4 anos de idade (vacina varicela) Profilaxia de pós-exposição: A vacina pode ser utilizada a partir dos 9 meses de idade;	
Idade recomendada	15 meses e 4 anos	
Conservação	Temperatura: +2°C a +8°C Tempo de duração: Observar o prazo de validade do produto. Utilizar imediatamente após diluição.	
Via de administração	Via subcutânea	
Dose	Volume: 0,5mL	
Eficácia esperada	Acima de 95%	
Contraindicações	As contraindicações de caráter geral: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hipersensibilidade conhecida à neomicina ou qualquer outro componente da vacina;</li> <li>• Gestante ou mulheres em idade fértil que pretendem engravidar dentro de 1 mês. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Imunodeficiência primária ou secundária.</li> </ul> </li> </ul>	
Eventos adversos	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Locais: dor, vermelhidão, vesículas no local da aplicação;</li> </ul> Sistêmicos: febre, exantema, convulsão febril, anafilaxia, meningite, herpes-zoster grave, encefalite, ataxia, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson, pneumonia, trombocitopenia e síndrome de Guillain-Barré.	