

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO – POP PRAZO DE UTILIZAÇÃO DAS VACINAS DEPOIS DA ABERTURA DO FRASCO			POP Nº 022 VERSÃO Nº 01
Data da Emissão: 14/11/2019	Próxima revisão: ___/___/___	 MUNICÍPIO DE ITAJAÍ	
Atividade: Informações sobre o prazo de utilização das vacinas após a abertura do frasco			
Executante: Enfermeiros e Técnicos, Auxiliares de Enfermagem			
Objetivo: Apresentar informações sobre o prazo de utilização das vacinas após a abertura do frasco			
PRAZO DE UTILIZAÇÃO DAS VACINAS DEPOIS DA ABERTURA DO FRASCO			
Vacina	Apresent. em doses	Laboratórios	Prazo de utilização, após abertura do frasco, segundo a bula do produtor
BCG-ID vacina BCG	10 doses	FAP	A vacina diluída deve ser usada no mesmo dia, por no máximo 6 horas , mantendo-a sob refrigeração (+2°C a +8°C).
Hepatite B vacina Hepatite B (recombinante)	10 doses	Instituto Butantan	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, somente poderá ser consumida em até 15 dias se mantida em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a +8°C.
Hepatite B vacina Hepatite B (recombinante)	20 doses	Sanofi	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, somente poderá ser consumida em até 10 dias se mantida em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a +8°C.
Hepatite B vacina Hepatite B (recombinante)		Serum Institute of India ou LG Life Sciences	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, somente poderá ser consumida em até 28 dias se mantida em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a +8°C.
Vacina Poliomielite vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada).		Bio-Manguinhos	Sobra da vacina contra poliomielite oral trivalente deve ser descartada após 5 dias de abertura da bisnaga, desde que seja utilizada técnica asséptica. <ul style="list-style-type: none"> • Obs: No caso de vacinação extramuro, a sobra de vacina deverá ser desprezada no mesmo dia. • Obs: depois do descongelamento, mesmo o frasco estando fechado, utilizar por até 3 meses.
Febre Amarela	5 e 10 doses	Bio-Manguinhos	Depois da reconstituição, o prazo de utilização é de 6 horas desde que mantida em temperatura entre +2°C a +8°C e adotados os cuidados que mantenham a sua integridade.
Febre Amarela	50 doses	Bio-Manguinhos	Depois da reconstituição, o prazo de utilização é de 4 horas desde que mantida em temperatura entre +2°C a +8°C e adotados os cuidados que mantenham a sua integridade.
Tríplice bacteriana (DTP) vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis-DTP	Multidose	Instituto Butantan	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, pode ser utilizado em até 15 dias se mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a +8°C.
Tríplice bacteriana (DTP) vacina adsorvida difteria, tétano e pertussis-DTP	Multidose	Serum Institute of India ou Biofarma	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, pode ser utilizado em até 4 semanas se mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a +8°C.
Tríplice viral (SCR) vacina sarampo, caxumba e rubéola-SCR	10 doses	Bio-Manguinhos	Depois da reconstituição, usar até 8 horas , manter em temperatura entre +2°C a +8°C e os cuidados que mantenham a sua integridade.
Tríplice viral (SCR) vacina sarampo, caxumba e rubéola-SCR	10 doses	Sanofi Pasteur	Depois da reconstituição, usar até 6 horas , manter em temperatura entre +2°C a +8°C e os cuidados que mantenham a sua integridade.
Tríplice viral (SCR) vacina sarampo,	05 doses	Serum Institute of India	Depois da reconstituição, usar até 6 horas , manter em temperatura entre +2°C a +8°C e os cuidados que mantenham a sua integridade.

caxumba e rubéola-SCR			
Influenza-gripe	Multidose	Instituto Butantan ou Sanofi Pasteur	Depois de aberto o frasco-ampola de multidose, somente poderá ser utilizado em até 7 dias se mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a +8°C.
Dupla tipo adulto (dT) vacina adsorvida difteria e tétano - dT	Multidose	Instituto Butantan	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, pode ser utilizado em até 15 dias se mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a +8°C.
Dupla tipo adulto (dT) vacina adsorvida difteria e tétano - dT	Multidose	Intervax, Serum Institute of India ou Biological	Depois de aberto o frasco-ampola de múltiplas doses, pode ser utilizado em até 4 semanas se mantido em condições assépticas e sob temperatura entre +2°C a +8°C.
Vacina contra raiva célula vero (liofilizada)	Monodose	Instituto Butantan	Usar imediatamente , depois da sua reconstituição
Vacina Tríplice Acelular	Monodose	Sanofi Pasteur	Uma vez aberta a ampola, deve-se descartar imediatamente qualquer conteúdo não utilizado
Vacina Tríplice Acelular - Adulto	Monodose	GSK GSK - Smithkline	A vacina deve ser administrada imediatamente após abertura do recipiente
Vacina Meningocócica Conjugada C	Monodose	Novartis	Depois de reconstituída a vacina deve ser administrada imediatamente
Vacina Tetra Viral	Monodose	GSK - Smithkline	Após a reconstituição: o uso imediato é recomendado. No entanto a estabilidade a +2°C/+8°C foi demonstrada por 8 horas após a reconstituição.
Poliomielite Inativada - VIP	Multidose	Sanofi	Depois de aberto o frasco-ampola de multidose, somente poderá ser utilizado em até 28 dias , se mantido as condições assépticas e sob temperatura entre + 2°C e +8°C.
Haemophilus Influenzae b - Hib	Multidose	Bio-Manguinhos	Depois de aberto o frasco-ampola de multidose, somente poderá ser utilizado em até 5 dias , se mantido as condições assépticas e sob temperatura entre + 2°C e +8°C.

Observações:

1. As informações técnicas acima citadas são de responsabilidade de cada laboratório produtor, de acordo com a bula do produto. Um mesmo produto, dependendo do laboratório produtor, pode ter prazo de utilização diferente.
2. A tabela acima é apenas um instrumento facilitador para uso nas salas de vacina. Considerando que o laboratório produtor realiza estudos de tempo em tempo, podem ocorrer alterações no processo produtivo e no registro do produto. É necessário consultar a bula que acompanha o produto.
3. Após reconstituição, as vacinas Unidoses deverão ser aplicadas imediatamente.