



Itajaí, 17 de abril de 2023.

FLUXO DE ENCAMINHAMENTO PARA PACIENTES COM CISTOS E ABCESSOS DE BARTHOLIN

As glândulas de Bartholin são glândulas redondas e muito pequenas localizadas na vulva, nos dois lados da abertura da vagina. Uma vez que elas estão localizadas profundamente dentro da pele, elas normalmente não podem ser sentidas. Essas glândulas ajudam a fornecer líquidos para lubrificação durante relações sexuais.

Se o duto para a glândula estiver obstruído, a glândula se enche de muco e cresce. O resultado é um cisto. Esses cistos se desenvolvem em aproximadamente 2% das mulheres. Os cistos podem ficar infeccionados, formando um abscesso.

A maioria dos cistos de Bartholin não causa sintomas. Mas se os cistos ficarem grandes, eles podem causar desconforto ao sentar, caminhar ou ter relações



sexuais. É possível que a mulher note um caroço indolor perto da abertura da vagina, fazendo com que a vulva fique com uma aparência torta.

Caso o cisto fique infectado (formando um abscesso), ele causa dor intensa e, às vezes, febre. Os abscessos são sensíveis ao toque. A pele sobre eles fica avermelhada e a mulher pode ter secreção vaginal.


Casos que devem ser encaminhados ao Ambulatório de Cirurgia Ginecológica do

CRECEM:



Figura: Protocolo de atendimento à pacientes com Bartholinite de Repetição.

FLUXOGRAMA DE ATENDIMENTO PARA PACIENTES COM BARTHOLINITE DE REPETIÇÃO



*Pacientes com Bartholinite de repetição (2 episódios ou mais) no período de um ano, solicitar encaminhamento através do email: crescem.saudedamulher@itajai.sc.gov.br, constando: 1. data de tratamento realizado nos episódios de Bartholinite; 2. condição atual da paciente e possíveis medicamentos em uso.