

**INSTRUMENTO PARA ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL*****Critérios para encaminhamento para o ambulatório de alto risco***

DATA									
PONTUAÇÃO									
ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO GESTACIONAL									
RISCO..... Até 4 pontos Baixo Risco / Risco Habitual - Acompanhando com a equipe da APS									
RISCO..... 5 a 9 pontos Médio Risco - Acompanhando na APS, se necessário encaminhe para o AGAR-R.									
RISCO..... 10 ou mais pontos Alto Risco - Encaminhamento imediato ao AGAR-R e compartilhamento do cuidado.									
1 CARACTERÍSTICAS INDIVIDUAIS:									
< de 15 anos.....2									
> de 40 anos.....2									
Mulher de raça negra.....1									
Baixa escolaridade (<de 5 anos de estudo).....1									
2 CONDIÇÕES SOCIOECONÔMICAS:									
Tabagista ativa.....2									
Indícios de ocorrência de violência.....2									
Gestante em situação de rua ou em comunidades indígenas ou quilombola.....2									
3 AVALIAÇÃO NUTRICIONAL:									
Baixo peso no início da gestação (IMC<18).....2									
Sobrepeso (25-29,9kg).....1									
Obesidade (IMC > 30-39,9 kg).....4									
Obesidade grau 3.....10									
4 HISTÓRIA REPRODUTIVA ANTERIOR:									
2 abortos consecutivos ou 3 não consecutivos.....2									
Prematuridade na gestação anterior.....2									
Mais de um parto prematuro (<36 sem).....10									
Restrição de crescimento intrauterino na gestação anterior.....2									
Natimorto sem causa determinada.....10									
Incompetência Istmo Cervical.....10									
Isoimunização Rh.....5									
Pré-eclâmpsia com resultado obstétrico ruim (eclâmpsia, síndrome HELLP, óbito fetal intrauterino, internação materna em UTI).....10									
Psicose puerperal na gestação anterior.....10									
Transplante.....5									
Cirurgia bariátrica há menos de 6 meses.....10									
Acretismo placentário.....2									
5 INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS/OBSTÉTRICAS NA GESTAÇÃO ATUAL:									
Doença Hipertensiva da Gestação/Pré-eclâmpsia.....10									
Diabetes Gestacional não compensada com dieta durante 2 semanas.....10									
Infecção Urinária de repetição (3 x ou mais) ou infecção urinária alta.....10									
Cálculo renal com obstrução.....10									
Restrição de crescimento intrauterino.....10									
Feto acima do percentil 90% ou suspeita de macrosomia.....10									
Polidrâmnio/ Oligodrâmnio.....10									
Colo curto em USG transvaginal entre 20 e 24s.....10									
Suspeita de acretismo placentário.....10									
6 CONDIÇÕES CLÍNICAS PRÉVIAS À GESTAÇÃO:									
Hipertensão Arterial descompensada.....10									
Diabetes Mellitus 1 ou 2.....10									
Tireoidopatias (hipertireoidismo ou hipotireoidismo clínico).....10									
Doença Psiquiátrica Grave (como psicoses, depressão grave).....10									
Doenças hematológicas (doença falciforme, púrpura trombocitopênica autoimune e trombótica, talassemias, coagulopatias), antecedentes de tromboembolismo.....10									
Cardiopatias com repercussão hemodinâmica.....10									
Pneumopatias Graves (DPOC, Asma).....10									
Doenças Auto-imunes (Colagenose).....10									
Uso de medicamentos teratogênicos (Anticonvulsivantes: barbitúricos, carbamazepina, lamotrigina, fenitoína, primidona e fenobarbital. Estabilizadores de humor: carbonato de lítio, ácido valproico).....10									
Doença Renal Grave.....10									
Hemopatias e Anemia grave (hemoglobina < 8 g/dl).....10									
Hepatopatias crônicas (Hepatites Virais, Cirrose).....10									