








## MEDIDAS PREVENTIVAS

-  **MANTER O GRAMADO SEMPRE BEM APARADO;**
-  **EVITAR AREIA AO REDOR DO AMBIENTE;**
-  **VEDAR TODOS OS VÃOS DE PISOS E PAREDES DA CASA E MARCOS DE PORTA E JANELAS;**
-  **LIMPAR O CHÃO PROFUNDAMENTE REGULARMENTE;**
-  **IRRIGAR A TERRA OU A GRAMA COM UMA MISTURA DE 20 LITROS DE ÁGUA ACRESCIDOS DE 1 COPO DE VINAGRE E 1 COPO DE ÁGUA SANITÁRIA REGULARMENTE;**
-  **ASPIRAR O PISO EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO, DEBAIXO DE TAPETES E NAS FRESTAS DE PISO E PAREDE;**
-  **MANTER OS ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO VACINADOS, LIMPOS E VERMIFUGADOS, LEMBRANDO QUE PRECISAM DE CUIDADOS E ACOMPANHAMENTO VETERINÁRIO.**




PREFEITURA DE  
**ITAJAÍ**

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

DIRETORIA DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA  
NÚCLEO DE CONTROLE DE ZOONOSES

FONE: (47) 3249 5571

NCZ.SMS@ITAJAI.SC.GOV.BR



### CUIDADO:

CARRAPATOS PODEM TRANSMITIR DOENÇAS, SE VOCÊ FOI PICADO POR UM CARRAPATO E ADOECER, COMENTE COM O SEU MÉDICO.

# CARRAPATOS

## CONTROLE E PREVENÇÃO



# O QUE SÃO?


OS CARRAPATOS SÃO ARTRÓPODES ECTOPARASITAS, OU SEJA, VIVEM NA SUPERFÍCIE DO CORPO DE UM HOSPEDEIRO (ANIMAIS DOMÉSTICOS, ANIMAIS SILVESTRES E O HOMEM) E SE ALIMENTAM DE SANGUE, PODENDO ASSIM SER VETORES PARA ALGUMAS DOENÇAS.

O CICLO DE VIDA DE UM CARRAPATO INICIA-SE COMO OVO, TRANSFORMA-SE EM LARVA, POSTERIORMENTE EM NINFA E ADULTO. UMA FÊMEA PODE COLOCAR EM MÉDIA 6 MIL OVOS POR POSTURA. UM CARRAPATO PODE PERMANECER NO AMBIENTE POR LONGOS PERÍODOS SEM SE ALIMENTAR (ATÉ 24 MESES) O QUE DIFICULTA SEU CONTROLE.




## AMBIENTES FAVORÁVEIS PARA SEU DESENVOLVIMENTO

ALGUNS AMBIENTES DIFICULTAM O CONTROLE DOS CARRAPATOS, PELA DIFICULDADE DE CONTATO COM A APLICAÇÃO DO PRODUTO QUÍMICO, ALÉM DE CONSEGUIR SE PROTEGER DOS RAIOS SOLARES, COMO POR EXEMPLO:



BRITAS



GRAMA/AREIA



MUROS INACABADOS OU "CHAPISCADO"



FRESTAS DE PAREDES, PORTAS, JANELAS E CHÃO

## CONTROLE DO AMBIENTE

REALIZAR O TRATAMENTO DO AMBIENTE DE ACORDO COM AS RECOMENDAÇÕES APLICANDO O CARRAPATICIDA NO CHÃO, EM PLANTAS E CANTEIROS, PISOS, RALOS, NOS CANIS, MUROS, NO FORRO DA CASA E DEVE-SE DAR UMA ATENÇÃO ESPECIAL PARA AS FRESTAS. REPETIR A CADA 7 DIAS, ATÉ A DIMINUIÇÃO DA INFESTAÇÃO, PASSANDO PARA CADA 15 DIAS.

RETIRAR OS ANIMAIS DOMÉSTICOS E CRIANÇAS DO AMBIENTE QUE IRÁ RECEBER O TRATAMENTO ATÉ

QUE O PRODUTO USADO SEQUE COMPLETAMENTE, PARA EVITAR INTOXICAÇÃO.

LAVAR COBERTORES E ACESSÓRIOS DOS ANIMAIS

ALTERAR O PRODUTO A CADA 2 OU 3 APLICAÇÕES, PARA EVITAR QUE O CARRAPATO DESENVOLVA RESISTÊNCIA E O TRATAMENTO TORNE-SE EFICAZ.

UMA OPÇÃO CASEIRA É FAZER USO DE APARELHOS COM JATO DE VAPOR D'ÁGUA FERVENDO (APENAS NO AMBIENTE, NUNCA SOBRE O ANIMAL).

### CONTROLE NO ANIMAL

TOSAR OS ANIMAIS DE PELOS MÉDIOS E LONGOS.

APLICAR REGULARMENTE PRODUTOS POUR ON NO CÃO OU MANTÊ-LO COM COLEIRA CARRAPATICIDA.

BANHOS CARRAPATICIDAS DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES – CUIDADO PARA O ANIMAL NÃO INGERIR OU LAMBER O PRODUTO DURANTE O BANHO. NÃO DEIXAR O ANIMAL SECAR AO SOL OU COM SECADOR QUENTE E EVITAR CONTATO COM OS OLHOS.

QUANDO A INFESTAÇÃO É ALTA, INDICA-SE O USO DE CARRAPATICIDA POR VIA ORAL.

AO RETIRAR OS CARRAPATOS MANUALMENTE, NÃO É INDICADO MATÁ-LOS COM AS UNHAS, PODE-SE JOGÁ-LOS NO VASO SANITÁRIO, EVITANDO CONTATO COM O SANGUE E A DISPERSÃO DOS OVOS NO AMBIENTE.