



Aranha marrom



Aranha marrom



Não é
Agressiva



1 cm de corpo e
até 3 cm no total



Atividade
noturna



Lugares com
pouca iluminação
e movimentação

A aranha marrom costuma picar o homem quando comprimida contra o seu corpo.

Suas teias são irregulares que lembram algodão desfiado, construídas atrás de quadros, móveis, junto as cascas de árvores e frestas das residências.

Sinais e Sintomas

O local da picada é pouco dolorido onde costuma surgir uma lesão endurecida podendo evoluir para necrose de difícil cicatrização.



O acidente pode se tornar grave quando, além de necrose, os sintomas incluem anemia aguda, icterícia, insuficiência renal aguda e alterações de coagulação.

Pode haver a necessidade da aplicação do soro anti-loxoscélico ou anti-aracnídio.

ATENÇÃO

EM CASO DE ACIDENTE COM ARANHA:

- Lavar o local da picada com água e sabão; Não furar, cortar, queimar, espremer ou fazer sucção no local da ferida.
- Não aplicar folhas, pó de café, terra, fumo, querosene ou qualquer substância sobre a ferida.
- Não ingerir bebida alcoólica, beber muita água.
- Procure o serviço de saúde mais próximo.

Em caso de dúvida entre em contato com o Centro de
Informações Toxicológicas:

Fone: 0800 643 5252

E-mail: ciatoxsc@saude.sc.gov.br

Secretaria de Saúde de Itajaí
Vigilância Epidemiológica de Itajaí
Núcleo de Controle de Zoonoses

Fone: (47) 3249-5571

E-mail: ncz.sms@itajai.sc.gov.br



ARANHAS PEÇONHENTAS

**SAIBA COMO EVITAR ACIDENTES COM AS
PRINCIPAIS ESPÉCIES DE SANTA CATARINA**



MUNICÍPIO DE
ITAJAÍ



SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE



ARANHAS EM SANTA CATARINA

As aranhas peçonhentas encontradas no estado de importância médica, devido aos danos causados no ser humano, são dos gêneros Phoneutria (aranha armadeira) e Loxosceles (aranha marrom).

A gravidade do acidente depende da espécie da aranha, da idade da vítima e da sensibilidade dela ao veneno.



Aranha armadeira



Aranha armadeira



Agressiva



Até 4 cm de corpo e
15 cm de envergadura



Atividade
noturna



Salta até
40 cm

- Dor imediata e intensa, dormência no local da picada;
- Pode ocorrer náuseas, vômito e agitação;
- O acidente pode ser grave em crianças e idosos.
- Pode haver necessidade de soro anti-aracnídico.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO

