



Aranha armadeira

### Aranha marrom



Não é  
Agressiva



1 cm de corpo e  
até 3 cm no total



Atividade  
noturna



Lugares com  
pouca iluminação  
e movimentação

As teias são sua principal ferramenta de caça. São teias irregulares, que lembram algodão desfiado, construídas em fendas de barrancos, junto a cascas de árvores e, também, atrás de móveis, quadros e frestas das residências, principalmente em regiões de clima frio. A aranha marrom costuma picar o homem quando comprimida contra o seu corpo.



Aranha marrom

## PRIMEIROS SOCORROS

- ❗ LAVAR O LOCAL DA PICADA COM ÁGUA E SABÃO;
- ❗ BEBER MUITA ÁGUA;
- ❗ PROCURAR IMEDIATAMENTE O SERVIÇO DE SAÚDE MAIS PRÓXIMO PARA RECEBER O TRATAMENTO ADEQUADO;
- ❗ EM CASO DE DÚVIDA LIGUE PARA O CIT - CENTRO DE INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS 0800 643 5252.



# ARANHAS PEÇONHENTAS

**SAIBA COMO EVITAR ACIDENTES COM AS PRINCIPAIS ESPÉCIES DE SANTA CATARINA**



## ▶ ARANHAS

As aranhas compõem a ordem mais numerosa de aracnídeos, com mais de 35.000 espécies descritas, embora muitos especialistas afirmem que a quantidade pode chegar a 100.000. Desse total, apenas cerca de 20 espécies, distribuídas em quatro gêneros (Loxosceles, Phoneutria, Latrodectus, Atrax), são consideradas como de interesse médico, devido aos danos provocados no ser humano pelo seu veneno durante uma picada acidental.

## ▶ EM SANTA CATARINA

As aranhas peçonhentas de importância médica encontradas no estado são as dos gêneros Phoneutria (aranha armadeira) e Loxosceles (aranha marrom).



### Aranha armadeira



Agressiva



Até 4 cm de corpo e  
15 cm de envergadura



Atividade  
noturna



Salta até  
40 cm

Também conhecida como aranha-das-bananas, a armadeira não constrói teias. Ela caça suas presas e as imobiliza pela ação do veneno. No ataque, ela apoia-se nos dois pares de pernas traseiras, ergue as dianteiras e salta em direção ao seu alvo, picando-o com grande rapidez.

## SINTOMAS

### Aranha armadeira:

- Dor imediata e intensa no local da picada;
- Poucos sinais visíveis, com dormência no local da picada;
- Podem ocorrer náuseas, agitação, vômitos;
- Aumento da pressão sanguínea.


### Aranha marrom:

- A picada é pouco dolorosa;
- Uma lesão endurecida e escura costuma surgir no local da picada, podendo evoluir para necrose de difícil cicatrização;
- Em alguns casos, pode ocorrer o escurecimento da urina da vítima.



A gravidade do acidente depende da espécie da aranha, da idade da vítima e da sensibilidade dela ao veneno daquela espécie.

## MEDIDAS DE PREVENÇÃO



## FIQUE ATENTO

### Aranha armadeira:

O veneno causa dor intensa no local e o acidente pode ser grave em crianças, pessoas idosas ou sensíveis. Pode haver a necessidade do soro anti-veneno (anti-aracnídico).

### Aranha marrom:

O acidente pode se tornar grave quando, além da necrose, os sintomas incluem anemia aguda, icterícia, insuficiência renal aguda e alterações da coagulação. Pode haver a necessidade do soro anti-veneno (anti-loxoscélico ou anti-aracnídico).

## ATENÇÃO

Em caso de acidente com aranhas:

- Não furar, cortar, queimar, espremer ou fazer sucção no local da ferida;
- Não aplicar folhas, pó de café, terra, querosene, fumo ou qualquer outra substância sobre a ferida;
- Não ingerir bebida alcoólica.